

ILOŚĆ NETTO ŻYWNOSCI

5 saszetek

SKŁADNIKI

(1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza.

ZASTOSOWANIE

Do postępowania dietetycznego w biegunce, w którym: uzupełnia elektrolity utracone podczas biegunki

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

SPOSÓB UŻYCIA

1 saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Podawać porcjami w ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania: Dzieci do 15 kg m.c. – 4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu). Dzieci powyżej 15 kg m.c. oraz dorośli – 6 saszetek (1200 ml przygotowanego płynu). Po tym czasie w celu nawadniania podtrzymującego, płyn przygotowany wg powyższego przepisu podawać porcjami po 100 ml po każdym opróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

NAZWA ŻYWNOSCI

Elektrolyty



Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

WARTOŚĆ ODŻYWCZA/ SKŁADNIKI PRODUKTU

	W 100 ML PŁYNU	W 200 ML PŁYNU
Wartość energetyczna	6,36 kcal (26,6 kJ)	12,72 kcal (53,2 kJ)
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	0 g
Węglowodany, w tym cukry	1,35 g	2,70 g
Błonnik	0 g	0 g
Białko	0 g	0 g
Sól	260 mg	520 mg
Sód	170 mg	340 mg
Potas	80 mg, 4% RWS	160 mg, 8% RWS
Chlorki	230 mg, 29% RWS	460 mg, 58% RWS
Cytrynian	240 mg	480 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożywcza

OSTRZEŻENIA

Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. Przeciwwskazania: Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.